

Vakcinázási protokoll gyöngytyúk állományokban

ÉLETKOR	BETEGSÉG	BEADÁSI MÓD	KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT	MEGJEGYZÉS
napos	Baromfipestis/Newcastle betegség	spray	KÖTELEZŐ	163/2009 (X.27.) FVM rendelet
2-4 hét	Baromfipestis/Newcastle betegség	itatás	KÖTELEZŐ	163/2009 (X.27.) FVM rendelet
16-18 hét	Baromfipestis/Newcastle betegség	injekció (inaktivált vakcina)	KÖTELEZŐ NAGYLÉTSZÁMÚ TENYÉSZÁLLOMÁNY (>500)	163/2009 (X.27.) FVM rendelet

Védekezési program gyöngytyúk állományokban

BETEGSÉG	KÖTELEZŐ	MÓD	MEGJEGYZÉS
Baromfitífusz (Salmonella Gallinarum és Pullorum)	Minden tenyészállományban és keltetőüzemben	<ul style="list-style-type: none"> • vérvizsgálat <ul style="list-style-type: none"> ○ tojásrakás megkezdése előtt 3 héttel ○ állomány 20-25%-a termel <p>VAGY</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérvizsgálat vakcinázás előtt/befulladt tojás, elhullott naposcsibék (<5 napos) bakteriológiai vizsgálata 	49/2002 (V.24.) FVM rendelet járási hivatal által kijelölt állatorvos végzi
Madárinfluenza	hatósági állatorvos által monitoring		