

Vakcinázási protokoll pulykaállományokban

ÉLETKOR	BETEGSÉG	BEADÁSI MÓD	KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT	MEGJEGYZÉS
napos	Baromfipestis/Newcastle betegség	spray	KÖTELEZŐ	163/2009 (X.27.) FVM rendelet
	Szalmonellózis	itatás	AJÁNLOTT	
2-4 hét	Baromfipestis/Newcastle betegség	itatás	KÖTELEZŐ	163/2009 (X.27.) FVM rendelet
6-8 hét	Szalmonellózis ism.	itatás	AJÁNLOTT	
14-20 hét	Baromfihimlő	szárnyredőbe oltás	AJÁNLOTT	
	Szalmonellózis	injekció	AJÁNLOTT	
16-18 hét	Baromfipestis/Newcastle betegség	injekció (inaktivált vakcina)	KÖTELEZŐ NAGYLÉTSZÁMÚ TENYÉSZÁLLOMÁNY (>500)	163/2009 (X.27.) FVM rendelet

Védekezési program pulykaállományokban

BETEGSÉG	KÖTELEZŐ	MÓD	MEGJEGYZÉS
Baromfitífusz (Salmonella Gallinarum és Pullorum)	Minden tenyészállományban és keltetőüzemben	<ul style="list-style-type: none"> • vérvizsgálat <ul style="list-style-type: none"> ○ tojásrakás megkezdése előtt 3 héttel ○ állomány 20-25%-a termel <p>VAGY</p> <p>vakcinázott állomány esetén:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérvizsgálat vakcinázás előtt/befulladt tojás, elhullott naposcsibék (<5 napos) bakteriológiai vizsgálata 	49/2002 (V.24.) FVM rendelet járási hivatal által kijelölt állatorvos végzi
Szalmonellózis (közegészségügyileg jelentős szerotípusok)	tenyészállomány (létszámtól függetlenül!)	<ul style="list-style-type: none"> • keltető • napos – szállítódoboz felülete, elhullott csibék • 4 hetes- csizmatampon • tojásrakás megkezdése előtt 2 héttel csizmatampon • tojástermelés alatt 3 hetente csizmatampon 	180/2009 (XII.29) FVM rendelet vállalkozó végzi (+ hatósági mintavétel)
Madárinfluenza			hatósági állatorvos által monitoring