

Vakcinázási protokoll tyúkállományokban

ÉLETKOR	BETEGSÉG	BEADÁSI MÓD	KÖTELEZŐ/AJÁNLOTT	MEGJEGYZÉS
napos	Baromfipestis/Newcastle betegség	spray	KÖTELEZŐ	163/2009 (X.27.) FVM rendelet
	Marek-féle betegség	injekció	AJÁNLOTT	
	Szalmonellózis	itatás	AJÁNLOTT	
2 hét	Gumboro betegség	itatás	AJÁNLOTT	
2-4 hét	Baromfipestis/Newcastle betegség	itatás	KÖTELEZŐ	163/2009 (X.27.) FVM rendelet
	Fertőző bronchitis	itatás	AJÁNLOTT	
6 hét	Szalmonellózis ism.	itatás	AJÁNLOTT	
8 hét	Fertőző bronchitis ism.	itatás	AJÁNLOTT	
10 hét	Gumboro betegség ism.	itatás	AJÁNLOTT	
13 hét	Fertőző agy- és gerincvelőgyulladás	itatás	AJÁNLOTT	
14 hét	Baromfihimlő	szárnyredőbe oltás	AJÁNLOTT	
	Szalmonellózis	injekció	AJÁNLOTT	
16-18 hét	Baromfipestis/Newcastle betegség	injekció (inaktivált vakcina)	KÖTELEZŐ NAGYLÉTSZÁMÚ TENYÉSZÁLLOMÁNY (>500)	163/2009 (X.27.) FVM rendelet
	Bronchitis, Rhinotracheitis, Egg Drop Syndrome, Gumboro betegség	injekció	AJÁNLOTT	kombinált a baromfipestis elleni vakcinával

Védekezési program tyúkállományokban

BETEGSÉG	KÖTELEZŐ	MÓD	MEGJEGYZÉS
Baromfitífusz (Salmonella Gallinarum és Pullorum)	Minden tenyészállományban és keltetőüzemben	<ul style="list-style-type: none"> • vérvizsgálat <ul style="list-style-type: none"> ○ tojásrakás megkezdése előtt 3 héttel ○ állomány 20-25%-a termel <p>VAGY</p> <p>vakcinázott állomány esetén:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérvizsgálat vakcinázás előtt/befuadt tojás, elhullott naposcsibék (<5 napos) bakteriológiai vizsgálata 	<p>49/2002 (V.24.) FVM rendelet</p> <p>járási hivatal által kijelölt állatorvos végzi</p>
Szalmonellózis (közegészségügyileg jelentős szerotípusok)	≥ 50 tojó állomány	<ul style="list-style-type: none"> • keltető • napos – szállítódoboz felülete, elhullott csibék • tojásrakás megkezdése előtt 2 héttel csizmatampon • tojástermelés alatt minden 15. héten csizmatampon 	<p>180/2009 (XII.29) FVM rendelet</p>
	≥ 250 tenyészállomány	<ul style="list-style-type: none"> • keltető • napos – szállítódoboz felülete, elhullott csibék • 4 hetes- csizmatampon • tojásrakás megkezdése előtt 2 héttel csizmatampon • tojástermelés alatt 2 hetente csizmatampon 	<p>vállalkozó végzi</p> <p>(+ hatósági mintavétel)</p>
Madárinfluenza	hatósági állatorvos által monitoring		